

ECZEMA

DE MODERADO-A-SEVERO

**PÓNGASE A LA DELANTERA
CON CIBINQO**

UNA TABLETA DIARIA
QUE TRATA EL ECZEMA
DE FORMA PROACTIVA

100% SIN ESTEROIDES

**NO ES UNA INYECCIÓN
NI UNA CREMA**

Para personas de 12 años o más con eczema (dermatitis atópica) de moderado a severo que no respondieron a tratamientos anteriores y para quienes no han funcionado bien o no les son adecuados otros tratamientos, incluidos los medicamentos orales o inyectados.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DESTACADA

CIBINQO puede causar efectos secundarios graves, tales como:

- Infecciones Graves, Cáncer y Problemas en el Sistema Inmunitario y Coágulos de Sangre
- Mayor riesgo de muerte y eventos cardiovasculares graves, tales como ataque cardíaco, derrame cerebral o muerte, en personas de 50 años o más que tengan por lo menos un factor de riesgo de enfermedad cardíaca y que tomen un inhibidor de la cinasa de Janus (JAK)

Lea a continuación para conocer más sobre estos y otros riesgos graves.

*Vea la Información de Seguridad Importante completa en las páginas 18–21. Por favor, haga clic para ver la [Información de Prescripción](#) completa, incluyendo el **RECUADRO DE ADVERTENCIA** y la [Guía del Medicamento](#), o visite CIBINQO.com.*

CIBINQO no solo combate los brotes. Trata el eczema de moderado a severo de manera continua con una tableta diaria.

CIBINQO[™]
(abrocitinib) tabletas

Ya ha probado varios tratamientos pero aún parece como si tuviera que estar constantemente pendiente de sus brotes de eczema. CIBINQO (si-BINK-oh) funciona de manera continua para ayudarle a aliviar el picor y a despejar su piel con una tableta diaria. El tratamiento con CIBINQO le ayuda a ponerse a la delantera del eczema.

CIBINQO ha demostrado ayudar a:

**ACLARAR
LA PIEL** ✓
DE MANERA NOTABLE

RÁPIDO
ALIVIO DEL PICOR
EN SOLO 2 SEMANAS

Vea los datos en las páginas 6–9.

Pregúntele a su médico si CIBINQO es adecuado para usted.

Haga clic [aquí](#) para acceder a la **Guía para Consulta Médica**

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CIBINQO puede causar efectos secundarios graves, tales como:

Infecciones graves. CIBINQO puede reducir la capacidad de su sistema inmunitario para combatir infecciones. No comience a tomar CIBINQO si tiene algún tipo de infección, a menos que su proveedor de salud le indique que puede hacerlo. Han ocurrido infecciones graves, incluso tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus que pueden propagarse por todo el cuerpo, en personas que toman CIBINQO o medicamentos similares. Algunas personas han sido hospitalizadas o han muerto a causa de estas infecciones. Su riesgo de contraer culebrilla podría ser mayor mientras toma CIBINQO.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)

Su proveedor de salud debe hacerle una prueba de TB antes de comenzar el tratamiento con CIBINQO y vigilarle de cerca para detectar cualquier señal o síntoma de una infección de TB durante el tratamiento.

*Vea la Información de Seguridad Importante completa en las páginas 18–21. Por favor, haga clic para ver la [Información de Prescripción](#) completa, incluyendo el **RECUADRO DE ADVERTENCIA** y la [Guía del Medicamento](#), o visite [CIBINQO.com](https://www.CIBINQO.com).*

Millones de personas tienen eczema.

Pero no afecta a todos de la misma manera

Aproximadamente 8.7 millones de personas de 12 años o más en los EE. UU. viven con señales y síntomas de eczema (dermatitis atópica) de moderado a severo, que pueden incluir:

- Picor intenso
- Piel inflamada que se ve enrojecida o decolorada, según el tono de piel
- Protuberancias en la piel
- Supuración en la piel
- Engrosamiento de la piel
- Piel escamosa

El eczema puede tener un aspecto distinto en diferentes tonos de piel.

Parte posterior de la rodilla



Parte interior del codo



En las pieles más claras, el eczema a menudo se ve enrojecido.

Parte posterior de la rodilla



Parte interior del codo



En las pieles más oscuras, el eczema puede tener aspecto de manchas más oscuras y el enrojecimiento podría no ser tan visible.

Fotos realizadas para representar el eczema de moderado a severo.

Vea la [Información de Seguridad Importante completa](#) en las páginas 18–21. Por favor, haga clic para ver la [Información de Prescripción completa](#), incluyendo el **RECUADRO DE ADVERTENCIA** y la [Guía del Medicamento](#), o visite CIBINQO.com.

CIBINQO ofrece resultados comprobados

Estudios clínicos han demostrado:

PIEL NOTABLEMENTE MÁS ACLARADA AL CABO DE 3 MESES

Algunas personas vieron

75% DE MEJORÍA DE LA PIEL

Algunos vieron

 **PIEL ACLARARSE**
en parte o en su totalidad

ALIVIO RÁPIDO AL PICOR

Algunos sintieron menos picor

EN SOLO 2 SEMANAS

Los estudios de la seguridad y eficacia de CIBINQO demostraron que los resultados en adolescentes (de 12 a 17 años) eran coherentes con los resultados en adultos (18 años o más).

Vea la Información de Seguridad Importante completa en las páginas 18–21. Por favor, haga clic para ver la [Información de Prescripción](#) completa, incluyendo el **RECUADRO DE ADVERTENCIA** y la [Guía del Medicamento](#), o visite [CIBINQO.com](https://www.cibinqo.com).

CIBINQO
(abrocitinib) tabletas



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)

Infecciones graves (continuación). Antes y durante su tratamiento con CIBINQO, dígame a su médico de inmediato si tiene una infección, si está recibiendo tratamiento para una infección o si tiene síntomas de una infección, lo cual incluye: fiebre, sudoración o escalofríos; dolores musculares; tos o dificultad para respirar; sangre en la flema; pérdida de peso; piel o lesiones calientes, rojas o dolorosas en su cuerpo; diarrea o dolor estomacal; ardor al orinar o si está orinando con más frecuencia de lo usual; o si siente mucho cansancio.

CIBINQO puede aumentar su probabilidad de contraer infecciones o empeorar cualquier infección que ya tenga. Si contrae una infección grave, su proveedor de salud podría suspender el tratamiento con CIBINQO hasta que la infección esté controlada.

Existe un mayor riesgo de muerte en personas de 50 años o más que tienen por lo menos un factor de riesgo de enfermedad cardíaca (cardiovascular) y que están tomando un inhibidor de la cinasa de Janus (JAK) (tal como CIBINQO).

Ver es creer

En estudios realizados con 778 personas, un número significativamente mayor **piel aclarada total o parcialmente** al cabo de 3 meses de su tratamiento con CIBINQO solamente (el **26%** tomó 100 mg y el **41%** tomó 200 mg) en comparación con aquellos que tomaron placebo (**8%**).



Las fotos muestran áreas específicas de la piel de participantes adultos en un ensayo clínico a quienes se les diagnosticó eczema de moderado a severo. Estas áreas no necesariamente muestran la extensión completa del eczema o su aparición en otras partes de la piel. Los resultados individuales pueden variar.

Vea más fotos de pacientes y conozca cómo compartir su experiencia en [CIBINQO.com](https://www.cibinqo.com)

*Vea la Información de Seguridad Importante completa en las páginas 18–21. Por favor, haga clic para ver la [Información de Prescripción completa](#), incluyendo el **RECUADRO DE ADVERTENCIA** y la [Guía del Medicamento](#), o visite [CIBINQO.com](https://www.cibinqo.com).*

CIBINQO
(abrocitinib) tabletas


La dosis inicial recomendada de CIBINQO es 100 mg una vez al día. Si la dosis de 100 mg no funciona bien al cabo de 3 meses, su médico puede aumentar su dosis a 200 mg una vez al día. Si la dosis de 200 mg no funciona bien, su médico podrá recomendarle que deje de tomar CIBINQO.



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)

Cáncer y problemas del sistema inmunitario. CIBINQO puede aumentar su riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer al cambiar la manera en que funciona su sistema inmunitario. Puede desarrollar linfoma y otros tipos de cáncer, incluso cáncer de la piel. Corren un riesgo mayor de padecer ciertos tipos de cáncer, tales como linfoma y cáncer del pulmón, las personas que están tomando un inhibidor de la JAK, especialmente si fumaban en el pasado o fuman en el presente. Siga los consejos de su proveedor de salud en cuanto a revisar su piel durante el tratamiento para detectar cáncer de la piel. Limite el tiempo de exposición a la luz solar y evite utilizar cámaras o lámparas solares de bronceado. Siempre que vaya a estar expuesto al sol, use ropa protectora y bloqueador solar con SPF de 30 o más. Esto es especialmente importante si su piel es muy blanca o si tiene antecedentes familiares de cáncer en la piel. Indíquelo a su proveedor de salud si ha tenido algún tipo de cáncer alguna vez.

Conozca cómo CIBINQO interrumpe un proceso que puede causar inflamación y picor



Haga clic [aquí](#) para ver cómo funciona CIBINQO

Actualmente no se conoce cómo el inhibir ciertas proteínas JAK puede afectar el eczema.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)

Existe un mayor riesgo de eventos cardiovasculares (CV), tales como ataque cardíaco, derrame cerebral o muerte, en personas de 50 años o más que tengan por lo menos un factor de riesgo de enfermedad cardíaca (CV) y que tomen un inhibidor de la JAK, especialmente en quienes fumaban en el pasado o fuman actualmente.

Algunas personas que toman CIBINQO han sufrido eventos cardiovasculares graves.

Vea la Información de Seguridad Importante completa en las páginas 18–21. Por favor, haga clic para ver la [Información de Prescripción](#) completa, incluyendo el **RECUADRO DE ADVERTENCIA** y la [Guía del Medicamento](#), o visite [CIBINQO.com](https://www.CIBINQO.com).

Tome acción — hable con su médico

Los siguientes consejos le ayudarán a prepararse y aprovechar al máximo su próxima cita médica:



Apunte de antemano todas las preguntas que tenga sobre CIBINQO y recuerde tomar notas al hablar con su médico.



Si tiene una cita de telemedicina, ubíquese en un área bien iluminada para que su médico pueda ver su piel claramente y para que pueda tomarse fotos, de ser necesario. Evite todo aquello que pueda irritar su piel de antemano; por ejemplo, una ducha caliente.



Informe a su médico sobre síntomas como el picor y sobre la frecuencia de sus brotes de eczema. También describa su rutina de cuidado para el eczema, cómo le han funcionado otros tratamientos con receta y sus metas para el tratamiento.



Mencione todos los medicamentos que está tomando, incluso aquellos que son para otras enfermedades. Puede ser útil tomar fotos de cada etiqueta con su teléfono.

Hable con su médico para saber si CIBINQO es adecuado para usted

Antes de comenzar, asegúrese de indicar si usted:

- tiene una infección o síntomas de una infección
- padece de diabetes, enfermedad pulmonar crónica, VIH o un sistema inmunitario débil; tiene TB o ha estado en contacto cercano con alguien que tiene TB; ha tenido culebrilla (herpes zóster); ha tenido hepatitis B o hepatitis C
- ha tenido alguna vez algún tipo de cáncer; ha tenido coágulos de sangre en las venas de las piernas o pulmones; es o fue fumador; ha tenido un ataque cardíaco, otros problemas cardíacos o un derrame cerebral; tiene un conteo bajo de plaquetas o de glóbulos blancos; tiene niveles elevados de grasa en la sangre; tiene problemas oculares, tales como cataratas o desprendimiento de la retina
- vive, ha vivido o ha viajado a ciertos lugares (tales como los valles de los ríos Ohio y Misisipi o la región suroeste de los EE. UU.) en donde existe mayor posibilidad de contraer ciertos tipos de infecciones micóticas. Estas infecciones pueden ocurrir o empeorar al tomar CIBINQO. Pregúntele a su proveedor de salud si usted no sabe con seguridad si ha vivido en un área donde estas infecciones son comunes
- ha recibido vacunas recientemente o tiene planes de hacerlo
- está en estado de embarazo o lactando o tiene planes de hacerlo
- toma medicamentos con receta o sin receta (incluida la aspirina o cualquier medicamento antiplaquetario), vitaminas o suplementos naturales

**Continúe navegando
para ver los efectos
secundarios de CIBINQO**

Vea la Información de Seguridad Importante completa en las páginas 18–21. Por favor, haga clic para ver la Información de Prescripción completa, incluyendo el **RECUADRO DE ADVERTENCIA** y la Guía del Medicamento, o visite [CIBINQO.com](https://www.cibinqo.com).

CIBINQO
(abrocitinib) tabletas

Tome acción — hable con su médico

CIBINQO
(abrocitinib) tabletas

Los siguientes consejos le ayudarán a prepararse y aprovechar al máximo su próxima cita médica:



Apunte de antemano todas las preguntas que tenga sobre CIBINQO y recuerde tomar notas al hablar con su médico.



Si tiene una cita de telemedicina, ubíquese en un área bien iluminada para que su médico pueda ver su piel claramente y para que pueda tomarse fotos, de ser necesario. Evite todo aquello que pueda irritar su piel de antemano; por ejemplo, una ducha caliente.



Informe a su médico sobre síntomas como el picor y sobre la frecuencia de sus brotes de eczema. También describa su rutina de cuidado para el eczema, cómo le han funcionado otros tratamientos con receta y sus metas para el tratamiento.



Mencione todos los medicamentos que está tomando, incluso aquellos que son para otras enfermedades. Puede ser útil tomar fotos de cada etiqueta con su teléfono.

Vea la Información de Seguridad Importante completa en las páginas 18–21. Por favor, haga clic para ver la Información de Prescripción completa, incluyendo el **RECUADRO DE ADVERTENCIA** y la Guía del Medicamento, o visite [CIBINQO.com](https://www.cibinqo.com).

Visite [CIBINQO.com/discussion](https://www.cibinqo.com/discussion) para descargar nuestra Guía para Consulta Médica

¿Cuáles son los efectos secundarios graves y posibles de CIBINQO?

CIBINQO puede causar efectos secundarios graves, tales como:

- **Infecciones graves.** CIBINQO puede reducir la capacidad de su sistema inmunitario para combatir infecciones. Han ocurrido infecciones graves y algunas personas han sido hospitalizadas o han muerto. No comience a tomar CIBINQO si tiene una infección.
- **Mayor riesgo de muerte y eventos cardiovasculares (CV) graves**, tales como ataque cardíaco, derrame cerebral o muerte, en personas de 50 años o más que tengan por lo menos un factor de riesgo de enfermedad CV y que tomen un inhibidor de la JAK. Algunas personas que toman CIBINQO han sufrido eventos CV graves.
- **Cáncer y problemas del sistema inmunitario.** El riesgo de desarrollar linfoma o cáncer en la piel, los pulmones y de otro tipo puede aumentar, especialmente para quienes fumaban en el pasado o fuman actualmente.
- Pueden producirse **coágulos de sangre** en las venas de las piernas o los pulmones y estos pueden ser mortales. Esto ha ocurrido con mayor frecuencia en personas de 50 años o más que tienen por lo menos un factor de riesgo de enfermedad CV y que tomen un inhibidor de la JAK.
- Otros efectos secundarios graves incluyen cambios en ciertos resultados de laboratorio.

Los efectos secundarios más comunes de CIBINQO incluyen catarro común, náuseas, dolor de cabeza, herpes simple incluido el herpes labial, aumento en el nivel de creatina fosfocinasa en la sangre, mareo, infección del tracto urinario, cansancio, acné, vómitos, dolor bucal y de garganta, gripe, gastroenteritis viral, infección bacteriana de la piel, hipertensión arterial, sarpullido en la piel por alergia a algo con lo que entró en contacto, dolor estomacal, culebrilla y conteo bajo de plaquetas.

Se ha producido la separación o el desgarre del revestimiento de la parte posterior del ojo (desprendimiento de la retina) en personas que toman CIBINQO.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios.

Dígale a su médico si presenta algún efecto secundario. Para informar efectos secundarios, puede llamar a Pfizer al **1-800-438-1985** o contactar directamente a la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. (FDA) a través de www.fda.gov/MedWatch o llamando al **1-800-FDA-1088**.

Estamos aquí para usted en cada paso del camino

Para obtener ahorros y apoyo, regístrese en el programa de acceso para pacientes. Este programa ofrece:



Pague tan poco como \$0 con la Tarjeta de Ahorro en el Copago, si es elegible.*



Correos electrónicos exclusivos con herramientas, consejos e información sobre CIBINQO.



Representantes de asistencia en directo que pueden ayudarle a entender su cubierta y a examinar opciones de asistencia financiera. Llame al **1-833-956-DERM** (1-833-956-3376) de Lun–Vier, 8 AM–8 PM ET, o pregunte en la oficina de su médico.



Apoyo si su seguro retrasa o deniega la cubierta para CIBINQO. Los pacientes elegibles con seguro comercial que se hayan registrado en el programa Interim Care (“Cuidado Provisional”) pueden recibir CIBINQO por hasta 2 años sin costo alguno.† Llame al número indicado arriba para explorar sus opciones.

PFIZER DERMATOLOGY
patient access

*Debe ser elegible. No requiere cuota de membresía. Esta tarjeta no es un seguro médico. El beneficio máximo por paciente para obtener CIBINQO es de \$15,000 por año calendario. Para uso con seguro comercial solamente. Si se ha inscrito en un programa de seguro de recetas estatal o federal, no puede usar la tarjeta de copago. [Aplican términos y condiciones.](#)

†El programa Interim Care Rx (“Recetas de Cuidado Provisional”) no es un seguro de salud y está disponible solo para pacientes elegibles que tengan seguro comercial. La oferta solo está disponible para pacientes que hayan sido diagnosticados con una de las indicaciones aprobadas por la FDA para CIBINQO™ (abrocitinib) y cuya cubierta de seguro haya sido retrasada o denegada durante el proceso de preautorización o apelación. No está disponible para pacientes cubiertos por Medicaid, Medicare u otro programa de salud federal o estatal. [Aplican ciertos límites, términos y condiciones.](#)

Vea la *Información de Seguridad Importante completa* en las páginas 18–21. Por favor, haga clic para ver la *Información de Prescripción completa*, incluyendo el **RECUADRO DE ADVERTENCIA** y la *Guía del Medicamento*, o visite [CIBINQO.com](https://cibinqo.com).

CIBINQO™
(abrocitinib) tabletas

¿Está listo para registrarse?

Visite CIBINQO.com/Support para registrarse en el **programa de ahorros y apoyo Pfizer Dermatology Patient Access** y descubrir si es elegible para una Tarjeta de Ahorros en el Copago.*

Pague tan poco como \$0 por CIBINQO hoy mismo*



También puede usar cualquiera de las opciones a continuación para solicitar una Tarjeta de Ahorro en el Copago:

- Envíe el mensaje de texto **OFFER2** al **82000†**
- Llame al **1-833-956-DERM** (1-833-956-3376)
- Pregunte en la oficina de su médico

†[Aplican ciertos términos y condiciones de servicio móvil.](#) Podrían aplicar cargos por mensajes y datos. La frecuencia de los mensajes varía. Envíe el mensaje “HELP” para obtener más información o “STOP” para suspender los mensajes. La política de privacidad de Pfizer está disponible en Pfizer.com/privacy.



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE E INDICACIÓN

CIBINQO puede causar efectos secundarios graves, tales como:

Infecciones graves. CIBINQO puede reducir la capacidad de su sistema inmunitario para combatir infecciones. No comience a tomar CIBINQO si tiene algún tipo de infección, a menos que su proveedor de salud le indique que puede hacerlo. Han ocurrido infecciones graves, incluso tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus que pueden propagarse por todo el cuerpo, en personas que toman CIBINQO o medicamentos similares. Algunas personas han sido hospitalizadas o han muerto a causa de estas infecciones. Su riesgo de contraer culebrilla podría ser mayor mientras toma CIBINQO.

Su proveedor de salud debe hacerle una prueba de TB antes de comenzar el tratamiento con CIBINQO y vigilarle de cerca para detectar cualquier señal o síntoma de una infección de TB durante el tratamiento.

Antes y durante su tratamiento con CIBINQO, dígame a su médico de inmediato si tiene una infección, si está recibiendo tratamiento para una infección o si tiene síntomas de una infección, lo cual incluye: fiebre, sudoración o escalofríos; dolores musculares; tos o dificultad para respirar; sangre en la flema; pérdida de peso; piel o lesiones calientes, rojas o dolorosas en su cuerpo; diarrea o dolor estomacal; ardor al orinar o si está orinando con más frecuencia de lo usual; o si siente mucho cansancio.

CIBINQO puede aumentar su probabilidad de contraer infecciones o empeorar cualquier infección que ya tenga. Si contrae una infección grave, su proveedor de salud podría suspender el tratamiento con CIBINQO hasta que la infección esté controlada.

Existe un mayor riesgo de muerte en personas de 50 años o más que tienen por lo menos un factor de riesgo de enfermedad cardíaca (cardiovascular) y que están tomando un inhibidor de la cinasa de Janus (JAK) (tal como CIBINQO).

Cáncer y problemas del sistema inmunitario. CIBINQO puede aumentar su riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer al cambiar la manera en que funciona su sistema inmunitario. Puede desarrollar linfoma y otros tipos de cáncer, incluso cáncer de la piel. Corren un riesgo mayor de padecer ciertos tipos de cáncer, tales como linfoma y cáncer del pulmón, las personas que están tomando un inhibidor de la JAK, especialmente si fumaban en el pasado o fuman en el presente. Siga los consejos de su proveedor de salud en cuanto a revisar su piel durante el tratamiento para detectar cáncer de la piel. Limite el tiempo de exposición a la luz solar y evite utilizar cámaras o lámparas solares de bronceado. Siempre que vaya a estar expuesto al sol, use ropa protectora y bloqueador solar con SPF de 30 o más. Esto es especialmente importante si su piel es muy blanca o si tiene antecedentes familiares de cáncer en la piel. Indíqueme a su proveedor de salud si ha tenido algún tipo de cáncer alguna vez.

Existe un mayor riesgo de eventos cardiovasculares (CV), tales como ataque cardíaco, derrame cerebral o muerte, en personas de 50 años o más que tengan por lo menos un factor de riesgo de enfermedad cardíaca (CV) y que tomen un inhibidor de la JAK, especialmente en quienes fumaban en el pasado o fuman actualmente.

Algunas personas que toman CIBINQO han sufrido eventos cardiovasculares graves.

Obtenga ayuda de emergencia inmediatamente si comienza a presentar síntomas de un ataque cardíaco o derrame cerebral mientras toma CIBINQO, tales como: molestia en el centro del pecho que dure más de unos minutos o que se va y vuelve; rigidez, dolor, presión o pesadez intensas en el pecho, la garganta, el cuello o la mandíbula; dolor o molestia en los brazos, la espalda, el cuello, la mandíbula o el estómago; debilidad en una parte o un lado del cuerpo; habla arrastrada; falta de aliento con o sin molestia en el pecho; sudor frío abrupto; náuseas o vómitos o sensación de desmayo.

Coágulos de sangre. En algunas personas que toman CIBINQO, pueden producirse coágulos de sangre en las venas de las piernas (trombosis venosa profunda, TVP) o pulmones (embolia pulmonar, EP). Esto puede ser mortal. Los coágulos de sangre en las venas de las piernas y pulmones han ocurrido con mayor frecuencia en personas de 50 años de edad o más con por lo menos un factor de riesgo de enfermedad cardíaca (CV) y que toman un inhibidor de la JAK. Indíqueme a su proveedor de salud si ha tenido coágulos de sangre en las venas de las piernas o pulmones anteriormente.

Deje de tomar CIBINQO y obtenga asistencia médica de inmediato si presenta señales o síntomas de coágulos de sangre, tales como hinchazón, dolor o sensibilidad en una o ambas piernas; dolor repentino e inexplicable en el pecho o en la parte superior de la espalda; falta de aliento o dificultad para respirar.

Cambios en ciertos resultados de pruebas de laboratorio.

Su médico le debe hacer análisis de sangre antes y durante el tratamiento con CIBINQO para revisar sus conteos de linfocitos, neutrófilos, glóbulos rojos y plaquetas. No debe tomar CIBINQO si estos conteos resultan demasiado bajos. Su proveedor de salud podría suspender su tratamiento por un periodo de tiempo si se observan cambios en los resultados de estas pruebas de sangre.

Aumento de los niveles de colesterol. También podría presentar un aumento en la cantidad de grasa en la sangre. Su médico debe revisar su colesterol unas 4 semanas después de comenzar su tratamiento con CIBINQO y según sea necesario a partir de entonces.

*Vea la Información de Seguridad Importante completa en las páginas 20–21. Por favor, haga clic para ver la [Información de Prescripción completa](#), incluyendo el **RECUADRO DE ADVERTENCIA** y la [Guía del Medicamento](#), o visite CIBINQO.com.*

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE E INDICACIÓN (CONTINUACIÓN)

Durante los primeros 3 meses del tratamiento con CIBINQO, no tome medicamentos que eviten los coágulos de sangre, excepto por dosis bajas de aspirina (≤ 81 mg al día), si se le receta.

Antes de tomar CIBINQO, dígame a su proveedor de salud si:

- tiene una infección, está recibiendo tratamiento para una infección o tiene una infección constante o recurrente
- tiene diabetes, enfermedad pulmonar crónica, VIH o un sistema inmunitario débil
- tiene TB o ha estado en contacto cercano con alguien que tiene TB
- ha tenido culebrilla (herpes zóster)
- ha tenido hepatitis B o hepatitis C
- vive, ha vivido o ha viajado a ciertos lugares (tales como los valles de los ríos Ohio y Misisipi o la región suroeste de los EE. UU.) en donde existe mayor posibilidad de contraer ciertos tipos de infecciones micóticas. Estas infecciones pueden ocurrir o empeorar al tomar CIBINQO. Pregúntele a su proveedor de salud si usted no sabe con seguridad si ha vivido en un área donde estas infecciones son comunes
- ha tenido algún tipo de cáncer
- ha tenido coágulos de sangre en las venas de las piernas o de los pulmones
- es o fue fumador
- ha tenido un ataque cardíaco, otros problemas cardíacos o un derrame cerebral
- tiene problemas del riñón o del hígado
- obtiene resultados anormales en sus pruebas de sangre (conteo bajo de plaquetas o de glóbulos blancos)
- presenta niveles elevados de grasa en la sangre (colesterol alto)
- tiene problemas oculares, lo cual incluye cataratas o desprendimiento de la retina
- ha recibido recientemente o tiene en agenda recibir una vacuna. Las personas que toman CIBINQO no deben recibir vacunas vivas
- planea quedar o actualmente está en estado de embarazo. Se desconoce si CIBINQO puede hacer daño a su bebé en gestación. Pfizer tiene un **Registro de Exposición durante el Embarazo** para las mujeres embarazadas que toman CIBINQO, para comprobar su salud y la de su bebé. Si usted está o queda en embarazo mientras toma CIBINQO, pregúntele a su proveedor de salud cómo puede anotarse en este registro, llame al **1-877-311-3770**, o visite www.CIBINQOPregnancyRegistry.com para registrarse

- está lactando o planea lactar. Se desconoce si CIBINQO pasa a la leche materna. No debe tomar CIBINQO mientras esté lactando
- está tomando otros medicamentos, incluso medicamentos recetados o sin receta médica, vitaminas y suplementos naturales. CIBINQO puede interactuar con otros medicamentos y causar efectos secundarios. **En especial, dígame a su proveedor de salud si está tomando** aspirina o algún medicamento antiplaquetario. Pregúntele a su proveedor de salud si no está seguro de esto

Los efectos secundarios más comunes de CIBINQO incluyen catarro común, náuseas, dolor de cabeza, herpes simple incluido el herpes labial, aumento en el nivel de creatina fosfocinasa en la sangre, mareo, infección del tracto urinario, cansancio, acné, vómitos, dolor bucal y de garganta, gripe, gastroenteritis viral, infección bacteriana de la piel, hipertensión arterial, sarpullido en la piel por alergia a algo con lo que entró en contacto, dolor estomacal, culebrilla y conteo bajo de plaquetas.

Se ha producido la separación o el desgarre del revestimiento de la parte posterior del ojo (desprendimiento de la retina) en personas que reciben CIBINQO. Llame a su proveedor de salud de inmediato si sufre cambios súbitos en su visión.

CIBINQO puede ocasionar problemas de fertilidad en las mujeres, lo cual puede afectar su capacidad de quedar embarazadas. Hable con su proveedor de salud si tiene inquietudes acerca de la fertilidad.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de CIBINQO.

¿Qué es CIBINQO?

CIBINQO se usa para tratar a adultos y niños de 12 años o más con eczema (dermatitis atópica) de moderado a severo que no respondieron bien a otros tratamientos o cuyo eczema no se ha controlado bien con medicamentos recetados, incluidos los biológicos, o cuando no se pueden tolerar estos medicamentos.

Se desconoce si CIBINQO es seguro y efectivo para niños menores de 12 años.

Le exhortamos a informar las reacciones adversas relacionadas con los productos de Pfizer llamando al **1-800-438-1985** EE. UU. solamente). Si lo prefiere, puede contactar directamente a la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés). Visite www.fda.gov/MedWatch o llame al **1-800-FDA-1088**.

CIBINQO está disponible en tabletas de 50 mg, 100 mg y 200 mg.

*Por favor, haga clic para ver la Información de Prescripción completa, incluyendo el **RECUADRO DE ADVERTENCIA** y la Guía del Medicamento, o visite CIBINQO.com.*

CIBINQO[™]

(abrocitinib) tabletas

UNA TABLETA UNA VEZ AL DÍA

**Exclusivamente para el eczema
de moderado a severo.**

Una innovación de



Visite CIBINQO.com
para obtener más información

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)

Obtenga ayuda de emergencia inmediatamente si comienza a presentar síntomas de un ataque cardíaco o derrame cerebral mientras toma CIBINQO, tales como: molestia en el centro del pecho que dure más de unos minutos o que se va y vuelve; rigidez, dolor, presión o pesadez intensas en el pecho, la garganta, el cuello o la mandíbula; dolor o molestia en los brazos, la espalda, el cuello, la mandíbula o el estómago; debilidad en una parte o un lado del cuerpo; habla arrastrada; falta de aliento con o sin molestia en el pecho; sudor frío abrupto; náuseas o vómitos o sensación de desmayo.

*Vea la Información de Seguridad Importante completa en las páginas 18–21. Por favor, haga clic para ver la [Información de Prescripción](#) completa, incluyendo el **RECUADRO DE ADVERTENCIA** y la [Guía del Medicamento](#), o visite CIBINQO.com.*